

## Памятка населению по Африканской чуме свиней (АЧС)

### Профилактика заноса заболевания АЧС

В целях предупреждения заноса возбудителя АЧС в свиноводческие хозяйства, и индивидуальные подворья сопредельных с неблагополучными по заболеванию территориями, рационально заблаговременно провести и впоследствии поддерживать следующие мероприятия:

- перевести их на режим закрытых предприятий с запретом выгульного содержания свиней (в т.ч. и в хозяйствах населения);
- провести ограждение ферм;
- на въезде оборудовать пункты дезинфекции автотранспорта;
- обеспечить обслуживающий персонал сменной одеждой и обувью изолированно от производственных помещений, оборудовать санпропускники для переодевания и проведения личной гигиены, а также места для приема пищи;
- проводить ежедневный клинический осмотр свинопоголовья (в хозяйствах населения – регулярный осмотр);
- проводить лабораторные исследования по подтверждению устанавливаемых клинико-эпизоотическими методами диагнозов при массовых заболеваниях свиней. В соответствии с полученными результатами скорректировать схему профилактических мероприятий хозяйства;
- всех свиней (как в хозяйствах, так и на подворьях граждан) подвергать иммунизации против классической чумы и рожи;
- запретить скармливание свинопоголовью пищевых отходов и конфискатов без термической обработки. Проводить закупку кормов для свиней с территорий, благополучных по заразным заболеваниям. Надлежащим образом оборудовать места хранения и приготовления корма, с проведением контроля его и качества. Вода для поения животных должна быть подвергнута обеззараживанию;
- ограничить перемещение животных, с контролем здоровья свиней, подвергшихся переводу;
- регулярно, в полном объеме (как в помещениях содержания животных, так и на прилегающей территории) проводить дезакаризионные, дератизационные, дезинсекционные работы с контролем их эффективности. Исключить доступ птиц, собак, кошек в производственные помещения и места складирования кормов;
- убойные площадки, пункты, как и места аутопсии, оборудовать изолированно от животноводческих ферм;
- соответствующим образом организовать обеззараживание навоза, сточных вод, утилизацию трупов павших животных;
- очистить территорию хозяйства и прилегающую к нему зону от навоза, мусора.

АЧС – вирусная болезнь, к возбудителю которой восприимчивы только домашние и дикие свиньи (кабаны) независимо от возраста.

### ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ:

- укусы кровососущих насекомых (клещи, вши);
- скармливание зараженных пищевых отходов и зараженных кормов;
- дикие свиньи;
- продукты убоя зараженных свиней;
- автотранспорт, одежда людей, насекомые, грызуны, невосприимчивые домашние животные, находившиеся в местах боен и складов.

### КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:

- повышение температуры животных до 41 – 42° С;
- пропадает аппетит;
- повышение жажды;
- животные угнетены, все время лежат;
- появление истечений из носа и глаз, отмечается запор, а затем понос;
- супоросные свиноматки abortируются;
- наблюдается кровотечение из носа и нервные расстройства (судороги, поражения конечностей);
- на коже живота, ушей, внутренней поверхности бедер возникают кровоизлияния;
- гибель животного на 7 – 10 день.

### АЧС НЕ ЛЕЧИТСЯ, ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НЕЁ НЕТ!

### НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ:

- не допускать выгульное содержание свиней в частных подворьях населения, мелких и крупных товарных свиноводческих фермах;
- следить за состоянием свинопоголовья;
- проводить обработку свиней, мест их содержания от подкожных паразитов и насекомых, уделив особое внимание обработкам против клещей;
- не допускать использование пищевых отходов и корма свиньям без термической обработки.

### НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ:

При всех случаях заболевания свинопоголовья, при наличии клинических признаков, гибели домашних свиней немедленно информировать ветеринарную службу Колыванского района Новосибирской области по телефону 51 – 803.  
**ЗАПОМНИТЕ: ЛЮДИ ДАННОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕ БОЛЕЮТ!**